

Documento informativo sull'intervento di

TRATTAMENTO CON FILI RIASSORBIBILI

Informazioni generali

Il lifting con fili di trazione è un intervento chirurgico che consiste nel sollevare i tessuti del volto e del collo mediante il posizionamento di particolari suture dotate di sistemi di ancoraggio: si tratta di fili di sospensione composti da biomateriali (silicone solido e poliestere), quindi materiali permanenti, con particolari indentature denominati "Infinite-Threads" , marcati CE secondo la Direttiva 93/42/CEE sui dispositivi medici, prodotti in Francia dal laboratorio Thread & Lift, e certificati ISO 13485: 2016. Le indentature hanno direzione opposta nelle due metà del filo in modo da consentire con una metà l'aggancio del tessuto e con l'altra metà la sua sospensione.

I fili vengono inseriti in anestesia locale o, eventualmente con una sedazione superficiale, utilizzando aghi non taglienti, generalmente da un punto di ingresso a livello del cuoio capelluto della tempia o dalla regione dietro l'orecchio. La tecnica detta a "J profonda" viene eseguita senza l'uso del bisturi e garantisce che non vi siano cicatrici o scollamenti dei tessuti facciali. Questa è la principale differenza rispetto ai lifting tradizionalmente intesi. Il percorso del filo è profondo ed interessa, a seconda delle aree del volto, il cosiddetto SMAS (sistema muscolo aponeurotico superficiale) o il tessuto adiposo sottocutaneo allo scopo di ancorare e, quindi, sollevare il sopracciglio, la regione zigomatica attenuando la piega naso-labiale, la regione del bargiglio attenuando la cosiddetta piega della marionetta e alleggerendo il profilo mandibolare ed i tessuti del collo.

Dopo l'intervento è possibile che ci siano per 24-48 ore un gonfiore, un indolenzimento ed un senso di tensione nelle aree trattate; questi possono essere attenuati con un comune antidolorifico.

Il numero di fili impiantabili può variare in base al quadro clinico e ai risultati ricercati e sarà discusso con il medico.

Rischi ed effetti collaterali

Il trattamento di sollevamento dei tessuti con fili di sospensione è caratterizzato, generalmente, da complicazioni minime e molto rare . Prima di sottoporsi a questa procedura, è comunque essenziale comprenderne gli eventuali rischi, dato che si tratta di una procedura invasiva e in quanto tale, non può essere considerata completamente priva di rischi. I principali, generalmente, non hanno conseguenze e non necessitano terapie particolari, mentre alcuni, decisamente molto rari, possono richiedere una terapia ambulatoriale di qualche giorno.

I principali rischi includono:

- disagio post-trattamento, dato da lieve gonfiore, arrossamento e comparsa di lividi;
- infezione dell'area trattata, può richiedere l'assunzione di terapia antibiotica e la rimozione dei fili;
- asimmetria moderata che può richiedere un ritocco;
- irritazione, può durare alcuni giorni e si risolve spontaneamente;
- depressione nell'area di uscita del filo, può richiedere una manovra di liberazione del filo dalla porzione superficiale della pelle;
- alterazioni nervose, si manifestano con alterazioni temporanee dei movimenti della fronte e generalmente sono temporanee;
- irregolarità cutanee dovute al passaggio superficiale del filo, si correggono ambulatorialmente con iniezione di acido ialuronico.

Trattamenti alternativi

Esistono procedure alternative all'utilizzo dei fili permanenti, quali il trattamento a base di fili riassorbibili, posizionati più superficialmente e quindi meno efficaci nel sollevamento dei tessuti e dalla durata limitata ma meno "impegnativi" o i lifting.

Controindicazioni

Il trattamento con fili di sospensione riassorbibili non andrebbe effettuato in presenza di :

- allergia documentata al materiale dei fili;
- gravidanza in atto;
- Herpes in fase attiva; i pazienti predisposti all'Herpes possono effettuare una profilassi preventiva per via orale con farmaci anti-virali;
- Infezioni cutanee attive;
- malattie dermatologiche autoimmunitarie;
- disordini della coagulazione del sangue;
- precedenti trattamenti con filler permanenti (alcuni materiali non sono compatibili tra loro).

Convalescenza

Al termine del trattamento vengono, generalmente, applicati dei cerotti per proteggere le ferite puntiformi conseguenti all'entrata e uscita dei fili. Nel primo giorno successivo al trattamento è consigliabile evitare di toccare e/o grattare le zone trattate, applicare prodotti cosmetici e/o pomate, sciacquare o bagnare il viso, esporsi al sole, esporsi a fonti di calore e vento, effettuare attività sportive che comportino sudorazione. Dopo circa 6 ore dal trattamento sarà possibile applicare un make-up leggero nelle aree non coperte da cerotti.

Subito dopo il trattamento è consigliabile applicare impacchi freddi per circa 10 minuti sulle zone trattate. Il trattamento andrebbe ripetuto più volte.

Nella notte del trattamento è consigliabile dormire con il capo leggermente sollevato aggiungendo un cuscino.

Nei primi giorni è consigliabile mangiare cibi morbidi, evitare di sbadigliare aprendo molto la bocca ed evitare movimenti importanti con la mandibola. E' sconsigliabile sottoposti a massaggi e manipolazioni del viso.