



Documento informativo sull'intervento di

DEFINIZIONE DEI LINEAMENTI DEL VOLTO MEDIANTE FILLER

Informazioni generali

La forma del viso costituisce una delle caratteristiche del nostro aspetto che più viene a modificarsi col passare del tempo: numerosi studi antropomorfici hanno evidenziato come, nella maggior parte delle persone, vi siano delle aree del viso che risultano più piene con l'invecchiamento ed aree che, invece, tendono a svuotarsi a causa di assottigliamento dei tessuti molli e riassorbimento del tessuto osseo. Il viso prende spesso una forma squadrata perdendo la forma ovale di quando siamo più giovani.

Coloro che non sono contenti della forma del proprio viso e che desiderano cambiare il profilo della mandibola, gli zigomi, la regione delle tempie o tutti e tre queste componenti possono richiedere un intervento chirurgico come il lifting o il lipofilling. Non tutti sono pronti per questo tipo di trattamento e ricercano una soluzione meno drastica e impegnativa, con tempi di convalescenza più brevi e minor disagio post-trattamento. Per queste persone c'è una soluzione non invasiva costituita dalle iniezioni con acido ialuronico o lifting liquido. Poiché non vengono utilizzate incisioni, cicatrici o anestesia, la iniezione con acido ialuronico non comportano tempi di inattività significativi. I pazienti possono alzarsi e continuare la giornata come pianificato dopo il trattamento. È prevedibile un lieve gonfiore ed arrossamento, che spariscono in 24 ore. I risultati in genere durano in media circa 10-12 mesi. E' preferibile astenersi dall'esercizio fisico intenso e dall'alcol per almeno 24 ore dopo le iniezioni.

Rischi ed effetti collaterali

La definizione dei lineamenti con l'acido ialuronico è caratterizzata, generalmente, da complicazioni minime e molto rare. Prima di sottoporsi a questa procedura, è comunque essenziale comprenderne gli eventuali rischi, dato che si tratta di una procedura invasiva e in quanto tale, non può essere considerata completamente priva di rischi. I principali, generalmente, non hanno conseguenze e non necessitano terapie particolari, mentre alcuni, decisamente molto rari, possono richiedere una terapia ambulatoriale di qualche giorno.

I principali rischi includono:

- disagio post-trattamento, dato da lieve gonfiore, arrossamento e comparsa di piccoli lividi, si risolvono in qualche giorno spontaneamente;
- infezione dell'area trattata, può richiedere l'assunzione di terapia antibiotica;
- reazione allergica all'anestesia locale o al filler;
- formazione di noduli, generalmente temporanei e a risoluzione spontanea; formazione di granulomi, possono richiedere l'aspirazione del filler iniettato o l'utilizzo di una sostanza in grado di sciogliere il materiale;
- necrosi cutanea localizzata, se si verifica l'occlusione di un vaso sanguigno, può richiedere delle medicazioni ambulatoriali per alcuni giorni;
- l'iniezione in un vaso sanguigno maggiore, con conseguente occlusione dello stesso rappresenta un evento eccezionale e può comportare alterazioni della vista e cecità o ictus cerebrale.

Controindicazioni

Il trattamento con filler non andrebbe effettuato in presenza di :

- Allergia documentata al materiale da iniettare;

- Gravidanza in atto;
- Collagenopatie;
- Infezioni cutanee attive;
- Malattie dermatologiche autoimmunitarie;
- Disordini della coagulazione del sangue.
- Se possibile, in caso di assunzione di farmaci anticoagulanti o antiaggreganti, questi andrebbero sospesi, con l'autorizzazione del medico prescrittore, una settimana prima del trattamento;
- Precedenti trattamenti con filler permanenti (alcuni materiali non sono compatibili tra loro).

Trattamenti alternativi

L'unica alternativa è costituita dall'intervento chirurgico.

Convalescenza

Nelle 6 ore successive alle iniezioni è consigliabile evitare di toccare e/o grattare le zone trattate, applicare prodotti cosmetici e/o pomate, sciacquare o bagnare il viso, esporsi al sole, esporsi a fonti di calore e vento, effettuare attività sportive che comportino sudorazione. Dopo circa 6 ore dal trattamento sarà possibile applicare un make-up leggero.

Subito dopo il trattamento è consigliabile applicare impacchi freddi per circa 10 minuti sulle zone trattate. Il trattamento andrebbe ripetuto più volte.

Nella notte del trattamento è consigliabile dormire con il capo leggermente sollevato aggiungendo un cuscino.