



Documento informativo sull'intervento di

RIEMPIMENTO DELLE RUGHE CON FILLER

Informazioni generali

Il trattamento con filler dermici può attenuare le pieghe e le rughe del viso, aggiungere volume alle labbra e modellare le parti del viso che hanno perso volume e pienezza a causa dell'invecchiamento, dell'esposizione al sole, di alcune malattie, ecc. L'iniezione viene effettuata nello spessore o sotto la cute con un ago molto sottile o con una cannula, vale a dire un ago con la punta arrotondata. Questo produce un naturale aumento del volume sotto le rughe che vengono sollevate e attenuate. I risultati sono immediatamente evidenti.

Il trattamento, a seconda delle aree del viso, può richiedere l'utilizzo di anestesia locale, sotto forma di crema che va applicata almeno 30 minuti prima del trattamento, o di iniezioni. L'anestetico locale utilizzato è, generalmente, lo stesso utilizzato per uso odontoiatrico.

Il ringiovanimento del viso mediante l'iniezione di fillers è caratterizzato, generalmente, da complicazioni minime e molto rare. Prima di sottoporsi a questa procedura, è comunque essenziale comprenderne gli eventuali rischi, dato che si tratta di una procedura invasiva e in quanto tale, non può essere considerata completamente priva di rischi. I principali, generalmente, non hanno conseguenze e non necessitano terapie particolari, mentre alcuni, decisamente molto rari, possono richiedere una terapia ambulatoriale di qualche giorno.

Rischi ed effetti collaterali

Il ringiovanimento del viso mediante l'iniezione di filler è caratterizzato, generalmente, da complicazioni minime e molto rare. Prima di sottoporsi a questa procedura, è comunque essenziale comprenderne gli eventuali rischi, dato che si tratta di una procedura invasiva e in quanto tale, non può essere considerata completamente priva di rischi. I principali, generalmente, non hanno conseguenze e non necessitano terapie particolari, mentre alcuni, decisamente molto rari, possono richiedere una terapia ambulatoriale di qualche giorno.

I principali rischi includono:

- disagio post-trattamento, dato da lieve gonfiore, arrossamento e comparsa di piccoli lividi, si risolvono in qualche giorno spontaneamente;
- infezione dell'area trattata, può richiedere l'assunzione di terapia antibiotica;
- reazione allergica all'anestesia locale o al filler;
- riattivazione dell'herpes (herpes labiale), può richiedere l'applicazione di pomata o l'assunzione di farmaci antivirali;
- formazione di noduli, generalmente temporanei e a risoluzione spontanea; formazione di granulomi, possono richiedere l'aspirazione del filler iniettato o l'utilizzo di una sostanza in grado di sciogliere il materiale;
- necrosi cutanea localizzata, se si verifica l'occlusione di un vaso sanguigno, può richiedere delle medicazioni ambulatoriali per alcuni giorni;
- l'iniezione in un vaso sanguigno maggiore, con conseguente occlusione dello stesso rappresenta un evento eccezionale e può comportare alterazioni della vista e cecità o ictus cerebrale;
- nel caso di utilizzo di acido ialuronico macromolecolare, anche a distanza di mesi dall'iniezione, si può verificare edema (gonfiore), che può richiedere l'assunzione di farmaci antiinfiammatori.

Controindicazioni

Il trattamento con filler non andrebbe effettuato in presenza di :

- Allergia documentata al materiale da iniettare;
- Gravidanza in atto;
- Collagenopatie;
- Infezioni cutanee attive;
- Herpes in fase attiva; i pazienti predisposti all'Herpes possono effettuare una profilassi preventiva per via orale con farmaci anti-virali
- Malattie dermatologiche autoimmunitarie;
- Disordini della coagulazione del sangue.
- Se possibile, in caso di assunzione di farmaci anticoagulanti o antiaggreganti, questi andrebbero sospesi, con l'autorizzazione del medico prescrittore, una settimana prima del trattamento;
- Precedenti trattamenti con filler permanenti (alcuni materiali non sono compatibili tra loro).

Trattamenti alternativi

Esistono procedure alternative all'utilizzo dei fillers, quali il trattamento con tossina botulinica, trattamenti laser, le iniezioni di tessuto adiposo o altri tipi di intervento chirurgico.

Convalescenza

Nelle 6 ore successive alle iniezioni è consigliabile evitare di toccare e/o grattare le zone trattate, applicare prodotti cosmetici e/o pomate, sciacquare o bagnare il viso, esporsi al sole, esporsi a fonti di calore e vento, effettuare attività sportive che comportino sudorazione. Dopo circa 6 ore dal trattamento sarà possibile applicare un make-up leggero.

Subito dopo il trattamento è consigliabile applicare impacchi freddi per circa 10 minuti sulle zone trattate. Il trattamento andrebbe ripetuto più volte.

Nella notte del trattamento è consigliabile dormire con il capo leggermente sollevato aggiungendo un cuscino.